

# Dermite syphiloïde de Sevestre et Jacquet

khelfaoui.S,Benderradji.A ,Benrouiba.I ,Hamdene.N, Gaamoura.A,Fadhli.N,Belghazi.M,Meraane.L,Bioud.B

## Introduction:

la dermite papulo-érosive de Sevestre et Jacquet a été décrite en 1958 chez des nourrissons porteurs de couches non jetables. C'est une dermite du nourrisson moins de 06mois commençant par des lésions vésiculo-pustuleuse des convexités devenant secondairement ulcéro-nécrotique probablement De nature infectieuse (Staphylocoque Doré, Candida Albicans , Entérobactéries )

## Patient et méthode :

C'est le nourrisson Bouhzila Yaakoub âgé de deux mois, sans antécédents pathologiques personnels ni familiaux particuliers.

Admis pour la prise en charge d'une lésion interfessière installée de façon progressive depuis un mois et demi

## Examen clinique :

Nourrisson en bon état général, apyrétique

Lésion interfessière érythémato-pustuleuse, centrée par une plaque ulcéro-nécrosante avec perte de substance (figure1)

## Bilan étiologique :

Bilan infectieux: sans anomalie

Sérologie VIH: négative

Prélevement de pus :

klebsiella pneumoniae, proteus mirabilis, citrobacter Freundii



## Tableau 1: conseils de soins d'hygiène du siège

Fréquence de changement de couches  
Toilette de siège

Plus de 06fois par jour  
Détergent doux ( syndet , huile de nettoyage) lorsque les couches sont souillées par urines ou/ou selles , suivi d'un rinçage à l'eau puis d'un séchage soigneux  
Lingettes occasionnellement seulement  
Nettoyage avec un produit gras non détergent occasionnellement seulement  
Application de crème protectrice isolante , si possible comportant le cuivre le zinc, une fois voir plusieurs fois par jour

Crème protectrice

## Résultats et discussion :

La dermite papuloérosive de Sevestre et Jacquet est une variante de dermates irritatives. il s'agit de multiples papulonodules bien délimités, de coloration rouge vif, elle commence par des lésions érythémateuse, puis papuloérosive, pour aboutir a des lésions nodulaires, vésiculeuses et pustuleuse plusieurs facteurs favorisant cette affection : utilisation de coticoïdes topiques , surinfection par Candida Albicans , ou une dermite d'irritation chronique liée à des selles très liquides et fréquentes ou à des changes insuffisants

## Conclusion :

Les dermates de siège constituent une pathologie fréquente et multifactorielle chez le nourrisson dont le primum movens est l'occlusion et la macération sous les couches.

En absence d'amélioration malgré les soins adaptés, il faut savoir suspecter des causes plus rares, parfois intriquées la dermite de Sevestre et Jacquet .